



Circoncision chez l'enfant

La circoncision est une chirurgie mineure au cours de laquelle on enlève le prépuce d'un garçon pour des raisons médicales ou sociales.

La circoncision consiste à enlever le prépuce pour exposer le gland du pénis. Cette procédure est pratiquée depuis des milliers d'années pour plusieurs raisons : rituelles, religieuses, cosmétiques et médicales.

En Amérique du Nord, la plupart des circoncisions pratiquées après la période néonatale le sont pour des raisons médicales. Parmi ces dernières, il y a les infections de la vessie ou du prépuce et, plus souvent, un rétrécissement du prépuce qui ne permet pas sa rétraction pour découvrir le gland du pénis (**phimosis**).

L'intervention

Si votre médecin découvre que l'enfant présente une pathologie du prépuce, il ou elle peut recommander la circoncision. Il s'agit d'une intervention pratiquée dans une salle d'opération habituellement en **chirurgie d'un jour**. On communiquera avec vous pour vous donner des instructions au sujet de l'heure, de la date et de l'endroit où aura lieu l'intervention.

Pénis normal



À l'hôpital, on préparera l'enfant pour la chirurgie après qu'un(e) infirmier(ère) aura recueilli les renseignements nécessaires. On répondra à ce moment à toutes les questions que vous pourriez avoir.

La chirurgie se déroule habituellement sous **anesthésie générale**; on endormira donc l'enfant pour l'intervention. Il faut qu'il n'ait rien mangé ni bu, pas même de l'eau, plusieurs heures avant l'anesthésie pour réduire les risques de vomissements. On vous dira après quelle heure l'enfant ne pourra plus boire ni manger.

Après que l'enfant sera endormi, le pénis et la peau adjacente seront soigneusement nettoyés avec une solution antiseptique. Le prépuce sera ensuite enlevé, après quoi les bords de la peau seront rapprochés au moyen de points de suture fondants. Lorsque l'intervention sera terminée, il se peut qu'on applique sur l'incision un onguent antiseptique et un pansement. L'intervention dure généralement moins d'une heure.

Lorsque la chirurgie sera terminée, on amènera l'enfant à la salle de réveil, où des infirmier(ère)s spécialisé(e)s l'observeront de près jusqu'à ce que les effets de l'anesthésique aient disparu et qu'il puisse retourner à la maison sans problème. Vous devriez pouvoir retourner à la maison environ deux heures après la chirurgie.


Après la chirurgie

Après l'intervention, on peut habituellement contrôler la douleur avec de l'**acétaminophène** (Tempra®, Tylenol®, etc.) à la dose recommandée selon l'âge de l'enfant.

L'enfant se sentira plus à l'aise s'il porte des sous-vêtements et des pantalons amples. Emmenez ces vêtements à l'hôpital le jour de la chirurgie. La plupart des garçons peuvent reprendre leurs activités normales dans quelques jours, comme faire du sport et aller à l'école.

Il se peut que votre urologue vous demande d'appliquer sur l'incision un **onguent antiseptique** en vente libre. On n'a pas besoin d'enlever les points de suture, ils tomberont d'eux-mêmes.

Circoncision chez l'enfant



Notes / schémas :

Il arrive souvent que le pénis enfle ou présente une ecchymose (un bleu) au début, mais cela disparaît d'habitude en moins de deux semaines. Un léger suintement de sang peut se produire au niveau de l'incision dans les premières 48 heures.

Dans de rares cas, un saignement ou une infection apparaîtront après l'intervention et nécessiteront une consultation médicale.

La circoncision de l'enfant aura lieu le :

Jour : _____ Date : _____

Heure : _____ Endroit : _____

Notes : _____

Cette publication est produite par

Cette publication est approuvée par



Les informations présentées dans cette publication ne visent pas à remplacer une opinion médicale ni à se substituer à la consultation d'un médecin qualifié. L'Association des urologues du Canada décline toute responsabilité, légale ou autre, causée de quelque façon que ce soit, incluant la négligence, pouvant découler des informations contenues ou référencées dans cette brochure.

© 2014. Association des urologues du Canada. Tous droits réservés.

